

Informativo sobre Vacunación contra Influenza 2023

Objetivo:

Prevenir muertes y morbilidad grave causada o secundaria a infección por virus Influenza.

Población Objetivo:

- Niños y niñas desde los 6 meses de edad hasta 5° año básico (independiente de la edad)
- Trabajadores de la educación preescolar y escolar hasta 5° año básico

Se utilizará la vacuna trivalente “Influvac” del Laboratorio Abbott

Vacuna inactivada que protege contra 2 cepas para influenza A H1N1-H3N2) y 1 cepa para influenza B

Esta vacuna cumple con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la formulación de la vacuna en el hemisferio sur temporada 2023.

La protección se obtiene dentro de las 2 a 3 semanas después de vacunado.

Los niños hasta los 9 años de edad que no tienen antecedentes de vacunación completa previa, requerirán una segunda dosis con un intervalo mínimo de 4 semanas respecto a la primera dosis con el fin de optimizar su respuesta inmune.

Contraindicaciones:

- Hipersensibilidad inmediata a los componentes de la vacuna: entre los que se encuentran trazas de huevos, formaldehído, bromuro de cetiltrimetilamonio, polisorbato 80 o gentamicina.
- La inmunización deberá ser postergada en niños con estado febril (sobre 38°C axilar) o infección aguda (bronquitis, neumonía, varicela, etc.)
- En ningún caso la alergia alimentaria contraindica la administración de la vacuna anti-influenza (por ejemplo a frutos secos, proteína de la leche de vaca, pescados, mariscos, huevos, etc.).

Reacciones asociadas a la vacuna Influvac:

Las reacciones más frecuentes son las reacciones locales o sistémicas tales como dolor en el sitio de punción de la inyección, fatiga y/o dolor de cabeza.

Estas reacciones generalmente desaparecen dentro de 1-2 días sin tratamiento.